



წინაგულების ფიბრილაციის დროს ინსულტის და თრომბოემბოლიის  
განვითარების რისკის შეფასების შკალა - CHA2DS2-VA score



| CHA2DS2-VA კომპონენტი |                                                             | განმარტება და კომენტარები                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | მინიჭებული ქულები |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| C                     | გულის ქრონიკული უკმარისობა                                  | გულის უკმარისობის სიმპტომები და ნიშნები (LVEF-ის მიუხედავად, ამგვარად, მათ შორის HFpEF, HFmrEF და HFrEF), ან უსიმპტომო LVEF $\leq 40\%$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                 |
| H                     | ჰიპერტენზია                                                 | მოსვენების დროს არტერიული წნევა $>140/90$ მმ.ვწყ.სვ. მინიმუმ ორი შემთხვევა, ან მიმდინარე ანტიჰიპერტენზიული თერაპიის დროს. ძირითადი გულ-სისხლძარღვთა მოვლენების ყველაზე დაბალ რისკთან დაკავშირებული ოპტიმალური სამიზნე არტერიული წნევაა $120-129/70-79$ მმ.ვწყ.სვ. (ან შეინარჩუნეთ ის მაქსიმალურად დაბალ დონეზე).                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                 |
| A                     | ასაკი 75 წელი და მეტი                                       | ასაკი იშემიური ინსულტის რისკის დამოუკიდებელი განმსაზღვრელი ფაქტორია. ასაკთან დაკავშირებული რისკი უწყვეტია, მაგრამ პრაქტიკულობის მიზნით, 75 წელზე მეტი ასაკისთვის ორი ქულა ენიჭება.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                 |
| D                     | შაქრიანი დიაბეტი                                            | შაქრიანი დიაბეტი (ტიპი 1 ან ტიპი 2), როგორც ეს განსაზღვრულია ამჟამად მოქმედი კრიტერიუმებით, ან მკურნალობა გლუკოზის დონის დამწვევი თერაპიით.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                 |
| S                     | წარსულში გადატანილი ინსულტი, TIA ან არტერიული თრომბოემბოლია | წარსულში გადატანილი თრომბოემბოლია დაკავშირებულია რეციდივის მაღალ რისკთან და შესაბამისად, შეფასებულია 2 ქულით.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                 |
| V                     | სისხლძარღვების დაავადება                                    | კორონარული არტერიების დაავადება (კად), მათ შორის, მიოკარდიუმის ინფარქტის, სტენოკარდიის, კორონარული რევასკულარიზაციის (ქირურგიული ან პერკუტანული) ანამნეზი. ასევე, მნიშვნელოვანი კად დადასტურებული ანგიოგრაფიით ან გულის ვიზუალიზაციით.<br>ან<br>პერიფერიული სისხლძარღვთა დაავადება, მათ შორის: ხანგამოშვებით კოჭლობა, პერიფერიული ვენების დაავადების გამო წინა რევასკულარიზაცია, მუცლის აორტაზე პერკუტანული ან ქირურგიული ჩარევა და აორტის კომპლექსური ფოლაქები დადასტურებული ვიზუალიზაციით (განისაზღვრება, როგორც მობილობის, დანყლულების, პედუნკულაციის ან გათხელების $\geq 4$ მმ მახასიათებლები). | 1                 |
| A                     | ასაკი 65 - 74 წელი                                          | 65-დან 74 წლამდე მიენიჭება 1 ქულა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                 |

რეკომენდაციები წინაგულების ფიბრილაციის დროს  
თრომბოემბოლიური რისკის შესაფასებლად და მართვისთვის

იშემიური ინსულტის და თრომბოემბოლიის პრევენციის მიზნით, წინაგულების ფიბრილაციის მქონე პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ თრომბოემბოლიის მომატებული რისკი, რეკომენდებულია პერორალური ანტიკოაგულაცია.

I

A

CHA2DS2-VA შკალით 2 ან მეტი ქულა რეკომენდებულია როგორც თრომბოემბოლიური მომატებული რისკის ინდიკატორი პერორალური ანტიკოაგულაციის დანყების გადაწყვეტილების მისაღებად.

I

C

